



Comune di Pantelleria

BOLLETTINO **FITOSANITARIO N. 4**

Periodo: 23 aprile – 29 aprile 2026


Fase fenologica attuale:

(Emissione 5° foglia)

Elaborazione su base
DSS Agrigenius® Vite (BASF)

A cura dell'Ufficio Tecnico AGRIFARM2012

FASE FENOLOGICA



STAZIONI METEO DI RIFERIMENTO

- Stazione meteo 1:


[Bukkuram](#)

- Stazione meteo 2:

[Muéggen](#)

- Stazione meteo 3:

[Bugeber](#)



Precipitazioni dal 15/04 al 22/04

- Bukkuram: 47 mm
- Muéggen: 70 mm
- Bugeber: 25,7 mm

SITUAZIONE COMPLESSIVA

PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

Nel corso della settimana corrente si **evidenziano condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora**, con presenza di allerta infezione legata all'andamento meteorologico (elevata umidità, bagnatura fogliare prolungata e temperature idonee). **Si raccomanda pertanto di intervenire nei vigneti non adeguatamente coperti!**

OIDIO (*Erysiphe necator*)

Nel corso della settimana, si segnalano condizioni favorevoli e aggressive per lo sviluppo dell'oidio (**infezioni conidiche**). **Si raccomanda pertanto di intervenire nei casi in cui non siano stati effettuati trattamenti o dove sono stati impiegati prodotti con limitata persistenza!**

STAZIONE 1 – BUKKURAM


Peronospora



Oidio



Botrite



Black rot



22/4

23/4

24/4

25/4

26/4

27/4

28/4

29/4

PERONOSPORA

Il modello **non segnala rischi di infezioni di peronospora** nella settimana in oggetto.

OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** nella settimana in oggetto.

STAZIONE 2: MUÉGGEN

Peronospora



Oidio



Botrite



Black rot



22/4

23/4

24/4

25/4

26/4

27/4

28/4

29/4


PERONOSPORA

Il modello **segnala rischi di infezioni secondaria di peronospora** nella settimana in oggetto (23-28-29 aprile).

OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** nella settimana in oggetto.

STAZIONE 3: BUGEBER



PERONOSPORA

Il modello **segnala rischi di infezioni secondaria di peronospora** nella settimana in oggetto (23-28-29 aprile).

OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** nella settimana in oggetto.

Consigli di gestione

- ❑ **Tempistiche di intervento:** settimana ad alto rischio infettivo, per cui mantenere alta la copertura
- ❑ **Peronospora:** in questa finestra, è consigliato posizionare sostanze attive efficaci come **ditianon**, ametoctradin, cimoxanil, mandipropamide.
- ❑ **Oidio:** è consigliato intervenire con sostanze attive come **mefentrifluconazolo** o tetraconazolo.
- ❑ **Fase fenologica:** la coltura è in **attiva crescita** → **massima recettività** alle infezioni.

TEMPESTIVITA' E COPERTURA sono determinanti per la protezione.