



Comune di Pantelleria

BOLLETTINO **FITOSANITARIO N. 8**


Periodo: 09 giugno 2026 – 16 giugno
2026

Fase fenologica attuale:
(Fioritura – acino pepe)

Elaborazione su base
DSS Agrigenius® Vite (BASF)

A cura dell'Ufficio Tecnico AGRIFARM2012

FASE FENOLOGICA



STAZIONI METEO DI RIFERIMENTO

- Stazione meteo 1:


[Bukkuram](#)

- Stazione meteo 2:

[Muéggen](#)

- Stazione meteo 3:

[Bugeber](#)



Precipitazioni dal 20/05 al 09/06

- Bukkuram: 0 mm
- Muéggen: 0 mm
- Bugeber: 0 mm

SITUAZIONE COMPLESSIVA

PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

Nel corso della settimana corrente, **non si evidenziano condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora secondaria**. Nonostante ciò, diventa fondamentale tenere in considerazione l'eventuale gestione degli eventi di infezione primaria e **si raccomanda di intervenire nei vigneti non adeguatamente coperti!**


OIDIO (*Erysiphe necator*)

Nel corso della settimana, si segnalano condizioni favorevoli e aggressive per lo sviluppo dell'oidio (**infezioni conidiche**). **Si raccomanda pertanto di intervenire nei casi in cui non siano stati effettuati trattamenti o dove sono stati impiegati prodotti con limitata persistenza!!!**

BOTRITE (*Botrytis cinerea*)

In tutti gli areali di monitoraggio, si segnalano condizioni favorevoli per lo sviluppo di botrite, **per cui si raccomanda di intervenire nei vigneti più soggetti a questo patogeno fungino.**

STAZIONE 1 – BUKKURAM



PERONOSPORA

Il modello **non segnala rischi di infezioni di peronospora** nella settimana in oggetto.


OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** nella settimana in oggetto.

BOTRITE

Il modello **segnala rischi di infezioni di botrite** nei primi giorni della settimana in oggetto.

STAZIONE 2: MUÉGGEN



PERONOSPORA

Il modello **non segnala rischi di infezioni di peronospora** nella settimana in oggetto.


OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** nella settimana in oggetto.

BOTRITE

Il modello **segnala rischi di infezioni di botrite** nella settimana in oggetto.

STAZIONE 3: BUGEBER



PERONOSPORA

Il modello **segnala rischi di infezioni secondarie di peronospora** nella settimana in oggetto.

OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** nella settimana in oggetto.

BOTRITE

Il modello **non segnala rischi di infezioni di botrite** nella settimana in oggetto.

Consigli di gestione

- ☐ **Tempistiche di intervento:** settimana ad **alto rischio infettivo**, per cui mantenere alta la copertura!
- ☐ **Peronospora:** in questa finestra, è consigliato posizionare sostanze attive efficaci come **ditianon**, ametoctradin, cimoxanil, mandipropamide.
- ☐ **Oidio:** è consigliato intervenire con sostanze attive come **fluxapyroxad**, **mefentrifluconazolo** o tetraconazolo.
- ☐ **Botrite:** in questa finestra, è consigliato posizionare sostanze attive efficaci come **Bacillus amilolyquefaciens**, Fluazinam, Ciprodinile Fludioxonil.
- ☐ **Fase fenologica:** la coltura è in **attiva crescita**
→ **massima recettività** alle infezioni.