



Comune di Pantelleria

BOLLETTINO **FITOSANITARIO N. 9**

Periodo: 02 luglio 2026 – 9 luglio 2026


Fase fenologica attuale:

(Ingrossamento acino)

Elaborazione su base
DSS Agrigenius® Vite (BASF)

A cura dell'Ufficio Tecnico AGRIFARM2012

FASE FENOLOGICA



STAZIONI METEO DI RIFERIMENTO

- Stazione meteo 1:


[Bukkuram](#)

- Stazione meteo 2:

[Muéggen](#)

- Stazione meteo 3:

[Bugeber](#)



Precipitazioni dal 17/06 al 01/07

- [Bukkuram](#): 0,2 mm
- [Muéggen](#): 0 mm
- [Bugeber](#): 0 mm

SITUAZIONE COMPLESSIVA

PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

Nel corso della settimana corrente, **si evidenziano condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora secondaria**. Nonostante ciò, diventa fondamentale tenere in considerazione l'eventuale gestione degli eventi di infezione secondaria e **si raccomanda di intervenire nei vigneti non adeguatamente coperti!**


OIDIO (*Erysiphe necator*)

Nel corso della settimana, si segnalano condizioni favorevoli e aggressive per lo sviluppo dell'oidio (**infezioni conidiche**). **Si raccomanda pertanto di intervenire nei casi in cui non siano stati effettuati trattamenti o dove sono stati impiegati prodotti con limitata persistenza!!!**

BOTRITE (*Botrytis cinerea*)

In tutti gli areali di monitoraggio, si segnalano basse condizioni per lo sviluppo di botrite, **per cui si raccomanda attenzionare e intervenire solo nei vigneti molto suscettibili.**

STAZIONE 1 – BUKKURAM



PERONOSPORA

Il modello **non segnala rischi di infezioni di peronospora** nella settimana in oggetto.


OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** nella settimana in oggetto.

BOTRITE

Il modello **segnala bassi rischi di infezioni di botrite** nei giorni successivi della settimana in oggetto.

STAZIONE 2: MUÉGGEN



PERONOSPORA

Il modello **segnala rischi medio- bassi** di infezioni di **peronospora** nella settimana in oggetto.


OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** nella settimana in oggetto.

BOTRITE

Il modello **non segnala rischi di infezioni di botrite** nella settimana in oggetto.

STAZIONE 3: BUGEBER



PERONOSPORA

Il modello **segnala rischi di infezioni secondarie di peronospora** nei primi giorni della settimana in oggetto.

OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** nella settimana in oggetto.

BOTRITE

Il modello **segnala bassi rischi di infezioni di botrite** nella settimana in oggetto.

Consigli di gestione

- ☐ **Pressione alta di oidio:** intervenire dove si è scoperti e **proteggere il grappolo**

- ☐ **Peronospora:** in questa finestra, è consigliato posizionare sostanze attive efficaci come **ametoctradin** e/o cimoxanil.

- ☐ **Oidio:** è consigliato intervenire con sostanze attive come **fluxapyroxad, mefentrifluconazolo, metrafenone** o tetraconazolo.

- ☐ **Botrite:** in questa finestra, è consigliato posizionare sostanze attive efficaci come **Bacillus amilolyquefaciens**, Fluazinam, Ciprodinile Fludioxonil.

- ☐ **Previsioni meteo:** Previste piogge Venerdì 03 luglio, inoltre, **prevista alta umidità** durante la settimana, attenzionare le rugiade mattutine!